

# POUL-VITE

Reg. No. 950007

This water soluble powder is indicated for use in poultry. Poul-Vite should be given to:

- 1) Starting chicks and poults for their first 4 days to give them a good head start.
- 2) Chickens and turkeys in cases of reduced food intake.

Presentation/Packing:

100 gram pack; 50 packs/carton



# Super-Iodide Salt

Din 02079712

For use in cattle as a feed supplement for iodine deficiencies, an expectorant, and as an aid in the treatment of infertility.

Presentation/Packaging:

400g pack; 40 packs/carton

10 kg pail

**INDICATIONS:** For use in cattle as a feed supplement for iodine deficiencies, an expectorant, and as an aid in the treatment of infertility.

**INDICATIONS:** Pour usage chez les bovins, comme un supplément alimentaire dans le cas de déficiences en iode, un expectorant, et pour aider dans le traitement d'infertilité.

**DIRECTIONS:**

**Feed Supplement** - Feed continuously, 50 mg EDDI (0.5 grams powder) per head per day, (200-400 g powder/tonne feed).

**Expectorant** - Administer orally 650-1300 mg EDDI (6.2-12.4 g powder) per head twice daily for 7 days.

**Infertility** - Administer orally 1300 mg EDDI (12.4 g powder) per head twice daily for 7 days.

**MODE D'EMPLOI:**

**Supplément alimentaire** - Administer 50 mg d'EDDI (0.5 g de poudre) par animal par jour (200-400 g poudre/bonne de nourriture) de façon continue.

**Expectorant** - Administer oralement 650-1300 mg EDDI (6.2 - 12.4 g de poudre) par animal deux fois par jour pendant 7 jours.

**Infertilité** - Administer oralement 1300 mg EDDI (12.4 g de poudre) par animal deux fois par jour pendant 7 jours.

**ACTIVE INGREDIENT:** Each 400 grams contains 42 g EDDI (ethylenediamine dihydroiodide) in a salt base. This is equivalent to 105 mg/g of EDDI.

**INGRÉDIENT ACTIF:** Chaque 400 g contient 42 g d'EDDI (éthylène diure d'iodure de diamine) dans un excipient de sel. Il est équivalent à 105 mg/g d'EDDI.

**CAUTION:** Until iodine tolerance is determined, administer this product with caution. Higher intake may cause intestinal disorders. In case of iodism, discontinue treatment. Signs include: increased salivation, sneezing, eye irritation, and swelling of eye lids. Animals recover after iodides are withdrawn.

**PRÉCAUTION:** Administer ce produit avec prudence, jusqu'à ce que la tolérance à l'iode soit bien définie pour les animaux traités. En cas d'iodisme, suspendre le traitement. De tels symptômes comprennent: de l'excès de salivation, éternuement, irritation des yeux, et gonflement des paupières. Les animaux se remettent une fois le traitement arrêté. Un apport supplémentaire à ce qui est recommandé pourrait occasionner des désordres intestinaux.

**STORAGE:** Keep out of sunlight.

**CONSERVATION:** Protéger de la lumière.

**FOR VETERINARY USE ONLY / POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**

**SUPER-IODIDE SALT**

Keep Out of Reach of Children / Garder Hors de la Portée des Enfants

DIN 02079712

Net Contents/Contenu Net:

**DOMINION VETERINARY LABORATORIES LTD.**  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2W 3R4

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

NUTRITIONAL AIDS

